

# Czy nadtlenek wodoru wpływa na aktywność katalazy?

Autor: Marta Olej  
05.12.2016.  
Zmieniony 15.02.2017.

## Informacje do doświadczenia:

- " Materiały: woda utleniona ( $H_2O_2$ ), wążtroba drobiowa, woda, dwie tacki
- " W wążtrobie występuje enzym-katalaza (zlokalizowany w peroksysomach)- który katalizuje reakcję rozkładu  $H_2O_2$   
 $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$
- "  $H_2O_2$  jest produktem metabolizmu komórkowego, który jest toksyczny dla organizmu

## Opis doświadczenia

Na dwóch tackach układamy wążtrobę. Jedną polewamy wodą utlenioną natomiast drugą wodą. Od razu można zauważyć przebieg reakcji. Na jednej z tacek, gdzie wzrasta aktywność katalazy pojawiają się pęcherzyki.

Problem badawczy: Czy nadtlenek wodoru wpływa na aktywność katalazy?

Hipoteza: Nadtlenek wodoru powoduje wzrost aktywności katalazy.

Próba badawcza: Polanie wążtroby nadtlenkiem wodoru.

Próba kontrolna: polanie wążtroby wodą.

## Wniosek

Nadtlenek wodoru (woda utleniona) to uboczny produkt przemiany materii i jest substancją toksyczną dla organizmu. Katalaza to enzym, który katalizuje proces rozkładu nadtlenu wodoru do wody i tlenu. Efektem tej reakcji są pęcherzyki powietrza (obserwujemy pienienie się). Komórki wążtroby w peroksysomach zawierają wysoki poziom katalazy, która pełni funkcję detoksykacyjną.

Zmodyfikowaliśmy nasze doświadczenie umieszczając wążtrobę we wrzącej wodzie. Zauważyliśmy mniejsze wydzielanie pęcherzyków. Katalaza to białko, które ulega denaturacji.

Opracowała Vanessa Wilk klasa IIIa